



Межрегиональное Общество
Детских Кардиохирургов
Общество специалистов по врожденным порокам сердца

Первый опыт проведения операции Yasui в ФЦССХ г. Хабаровск

Майдуров Ю.А., Налимов К.А., Шиганцов Д.С., Филатова-Андреева Н.А.
ФГБУ “Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии”, г. Хабаровск

5-й Всероссийский съезд

детских кардиохирургов и специалистов
по врожденным порокам сердца



Цель работы

представить непосредственные результаты операции Yasui в ФЦССХ г. Хабаровск у пациента с перерывом дуги аорты (ПДАо) тип В и резкой гипоплазией аортального клапана (АоК).



Материалы и методы



Межрегиональное Общество
Детских Кардиохирургов
Общество специалистов по врожденным порокам сердца

- ВПС диагностирован при рождении
- ПДАо тип В, ОАП, абберантная правая ПКА
- Гипоплазия Аок (Z-score -5).
- В 8 суток выполнено стентирование ОАП и суживание ветвей ЛА.
- В 23 дня выписан на амбулаторный этап.
- Повторная госпитализация в 7 месяцев (вес 7,7 кг, BSA 0,36 г/м²).
- По ЭХО-КГ: ДМЖП 10 мм, ФК Аок 5 мм (Z-score -5), КДИ ЛЖ 33 мл/м², стент проходим, градиент на правой ЛА 47/26 мм рт. ст., на левой 83/50 мм рт. ст.




Результаты



Межрегиональное Общество
Детских Кардиохирургов
Общество специалистов по врожденным порокам сердца

- Время окклюзии аорты 140 минут.
- Время ИК 255 минут.
- Без кардиотонической поддержки в п/о периоде.
- Экстубация пациента через 18 часов после операции.
- Повторная интубация на 3-и сутки в связи с БОС и нарастанием ДН.
- Общее время ИВЛ 64 часа.
- Перевод из ОАР на 7-е сутки
- Выписан домой на 13-е сутки



Заключение

Операция Yasui позволяет провести коррекцию перерыва дуги аорта при наличии обструкции пути оттока из левого желудочка.

В дальнейшем пациент после такой операции требует пожизненного наблюдения и повторных хирургических вмешательств.

